

2. MARKOVSKÉ VERIGE S FIKSNO ZAČETNO PORAZDELITVIJO

2.1. Osnovni pojmi

13. oktober 2025

Definicija: Časovna homogena markovsko veriga v diskretnem času in na diskretni množici stanj s fiksno porazdelitvijo sestavljajo:

- števna množica S - prostor stanj;
- verjetnostni prostor $(\Omega, \mathcal{F}, P)$;
- slučajne spremenljivke $X_0, X_1, X_2, \dots$ na $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ in z vrednostmi v $(S, 2^S)$
- prehodne verjetnosti $p_{x,y}$, $x, y \in S$, pri čemer zahtevamo, $p_{x,y} \geq 0$ za vse $x, y \in S$;

$$P(X_{n+1} = y \mid X_0 = x_0, X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) = p_{x_n, y},$$
brž ko je $P(X_0 = x_0, \dots, X_n = x_n) > 0$.

- $\sum_{y \in S} p_{x,y} = 1$ za vse $x \in S$.

Porazdelitvi slučajne spremenljivke X_0 pravimo začetna porazdelitev.

Prehodna matrika: $P = [p_{x,y}]_{x,y \in S}$

Za matriko $P = [p_{x,y}]_{x,y \in S}$ za katero je $\sum_{y \in S} p_{x,y} = 1$ za vse $x \in S$, pravimo, da je **stohastična**.

Opazka 2.1: Skupna porazdelitev procesa je naravno določena z začetno dobčena z začetno porazdelitvijo in prehodnimi verjetnostmi, saj je [izrek 1.4, opazka 18]
$$P(X_0 = x_0, X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) = P(X_0 = x_0) = p_{x_0, x_1} p_{x_1, x_2} \cdots p_{x_{n-1}, x_n}.$$

Opazka 2.2: Za vsako verjetnostno mero π na $(S, 2^S)$ in za vsako stohastično matriko $P \in [0, 1]^{S \times S}$ obstaja taka verjetnostna mero na $(S^{\mathbb{N}_0}, (2^S)^{\otimes \mathbb{N}_0})$, da je slučajni proces $X_0, X_1, \dots$ porazdeljen ^{produktna σ -algebra} skladno s to mero, markovska veriga z začetno porazdelitvijo π in prehodno matriko P .

Uporabimo namreč izrek 1.9: če je $P = [p_{x,y}]_{x,y \in S}$ najprej definiramo končnorazsežne porazdelitve $\mathbb{P}_n$ na $(S^{n+1}, (2^S)^{\otimes n+1})$ po predpisu:

$$\mathbb{P}_n(\{(x_0, x_1, \dots, x_n)\}) := \pi(\{x_0\}) p_{x_0, x_1} p_{x_1, x_2} \dots p_{x_{n-1}, x_n}.$$

Le-te so konsistentne (DV), torej obstaja ustrezna mero $\mathbb{P}_\infty$ na $(S^{\mathbb{N}_0}, (2^S)^{\otimes \mathbb{N}_0})$. Domača vaja = DV.

Opazka 2.3: Iz trditve 1.3 sledi, da za vsak $x \in S$ in vsak $D \subseteq S^n$ velja

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = y \mid \underbrace{(X_0, X_1, \dots, X_{n-1}) \in D, X_n = x}_{\text{disjunktna unija dogodkov oblike}} = p_{x,y}.$$

$$\{X_0 = x_0, X_1 = x_1, \dots, X_{n-1} = x_{n-1}, X_n = x_n\}$$

Med drugim je $\mathbb{P}(X_{n+1} = y \mid X_n = x) = p_{x,y}$. Nadalje trdi za vsako množico $D \subseteq S^{n+1}$ velja:

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = y \mid \underbrace{(X_0, X_1, \dots, X_n) \in D, X_n = x}_{\text{disjunktna unija dogodkov oblike}} = p_{x,y}.$$

$$\{X_0 = x_0, X_1 = x_1, \dots, X_n = x\}$$

Trditev 2.4: [razširitev lastnosti Markova na cel proces]:

Pogojno na poljuben dogodek oblike $\{(X_0, X_1, \dots, X_n) \in D\}$ z neničelno verjetnostjo je $X_n, X_{n+1}, \dots$ spet markovska veriga z istimi prehodnimi verjetnostmi, njena začetna porazdelitev pa se seveda ujema s pogojno porazdelitvijo slučajne spremenljivke X_n glede na $\{(X_0, X_1, \dots, X_n) \in D\}$.

Dokaz:

$$\begin{aligned} & \mathbb{P}((X_0, X_1, \dots, X_n) \in D \mid X_{n+m+1} = y \mid X_n = x_0, X_{n+1} = x_1, \dots, X_{n+m} = x_m) \\ & \stackrel{(1.2)}{=} \mathbb{P}(X_{n+m+1} = y \mid \underbrace{(X_0, X_1, \dots, X_n) \in D, X_n = x_0, X_{n+1} = x_1, \dots, X_{n+m} = x_m}_{(X_0, X_1, \dots, X_{n+m+1}) \in D'}) \\ & \stackrel{\text{prejšnja opazka}}{=} p_{x_m, y}. \end{aligned}$$

Opomba: Pri pogojevanju lahko Ω zožimo na poljuben dogodek Ω' , za katerega je $\{(X_0, X_1, \dots, X_n) \in D\} \subseteq \Omega' \subseteq \Omega$.

Posledica 2.5: Če s π_n označimo n -to robno porazdelitev, tj. porazdelitev slučajne spremenljivke X_n , je $X_n, X_{n+1}, \dots$ (brezpogojno) spet markovska veriga z istimi prehodnimi verjetnostmi in začetno porazdelitvijo π_n .

Opazka 2.6: $\pi_1(\{y_1\}) = \mathbb{P}(X_1 = y)$

$$\begin{aligned} & \pi_0 \left[\begin{array}{c} y \\ | \\ p \end{array} \right] \stackrel{\pi_1(y)}{=} \sum_{\substack{x \in S \\ \mathbb{P}(X_0 = x) > 0}} \mathbb{P}(X_0 = x) \mathbb{P}(X_1 = y \mid X_0 = x) \\ & \quad = \sum_{\substack{x \in S \\ \pi_0(\{x\}) > 0}} \pi_0(\{x\}) p_{x,y} \end{aligned}$$

Če torej prehodne verjetnosti uvrstimo v matriko $P = [p_{x,y}]_{x,y \in S}$, robne porazdelitve pa identificiramo z vrstičnimi vektorji, velja $\pi_1 = \pi_0 \cdot P$. Po posledici 2.5 pa je tudi $\pi_{n+1} = \pi_n P$. Z indukcijo sledi $\pi_n = \pi_0 P^n$.

Primer: vreme od prejšnjic:

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} \text{pre. jasno} & \text{pre. ob.} & \text{dež} \end{matrix} \\ \begin{matrix} \text{pretežno jasno} \\ \text{pretežno oblačno} \\ \text{dež} \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0.7 & 0.2 & 0.1 \\ 0.2 & 0.6 & 0.2 \\ 0.2 & 0.3 & 0.5 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$\pi_0 := [1, 0, 0]$$

$$\pi_1 = [1, 0, 0] P = [0.7 \quad 0.2 \quad 0.1]$$

$$\pi_2 = [0.7 \quad 0.2 \quad 0.1] P = [0.55 \quad 0.29 \quad 0.16]$$

Primer: slučajni sprehod na $\mathbb{Z}$, $p \in [0, 1]$

$$p_{k,k+1} := p, \quad p_{k,k-1} := 1-p, \quad X_0 = 0$$

$$\begin{aligned} X_n &= \text{št. pomikov navzgor} - \text{št. pomikov navzdol} \\ &= 2 \cdot (\text{št. pomikov navzgor}) - n \end{aligned}$$

$$\text{št. pomikov navzgor} \sim \text{Bin}(n, p)$$

$$\frac{X_n + n}{2} \Rightarrow \mathbb{P}(X_n = -n + 2k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}; \quad k \in \mathbb{Z}$$

Primer: $\pi_0 := \begin{bmatrix} 2/3 & 1/3 \end{bmatrix}$, $P := \begin{bmatrix} 3/4 & 1/4 \\ 1/2 & 1/2 \end{bmatrix}$

$$\pi_0 P = \begin{bmatrix} 2/3 & 1/3 \end{bmatrix}$$

Sledi $\pi_n = \begin{bmatrix} 2/3 & 1/3 \end{bmatrix}$ za vse $n \in \mathbb{N}_0$.

Definicija: Markovska veriga s fiksno začetno porazdelitvijo je **stacionarna**, če so vse robne porazdelitve enake.

Ekvivalentno: $\pi_1 = \pi_0$. $\left(\pi_0 \text{ je levi lastni vektor} \right)$
 $\pi_0 P$ za lastno vrednost 1

2.2. Časi ustavljanja

Definicija: Slučajna spremenljivka T z vrednostmi v $\mathbb{N}_0 \cup \{\infty\} = \{0, 1, 2, \dots, \infty\}$ je **čas ustavljanja** glede na slučajni proces $X_0, X_1, \dots$, če za vsak $n \in \mathbb{N}_0$ velja, da je dogodek $\{T = n\}$ natančno določen z $X_0, X_1, \dots, X_n$, t.j. če obstaja taka merljiva množica D_n , da je $\{T = n\} = \{(X_0, X_1, \dots, X_n) \in D_n\}$. $\hookrightarrow$ če ima X_k vrednosti v $(\mathcal{S}_k, \mathcal{I}_k)$ zahtevamo $D_n \in \mathcal{I}_0 \otimes \mathcal{I}_1 \otimes \dots \otimes \mathcal{I}_n$.

Primeri in protiprimer:

1) Čas zadetja množice $C \in \mathcal{I}$, t.j. $T_C := \min \{n \in \mathbb{N} \mid X_n \in C\}$ ob dogovoru $\min \emptyset := \infty$, je čas ustavljanja.

$$\begin{aligned} \{T = n\} &= \{X_0 \notin C, X_1 \notin C, \dots, X_n \in C\} \\ &= \{(X_0, X_1, \dots, X_{n-1}, X_n) \in (C^c)^n \times C\} \end{aligned}$$

2) Naj bo $(S, \mathcal{F}) := (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ Borelva σ -algebra

$T := \min \{n \in \mathbb{N} \mid X_n > X_{n-1}\}$ je čas vstavljanja

$$\{T = n\} = \{X_0 > X_1 > X_2 > \dots > X_{n-1} < X_n\}$$

3) $(S, \mathcal{F}) = (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$

$T := \min \{n \in \mathbb{N}_0 \mid X_{n+1} > X_n\}$ tipično ni čas vstavljanja (razen, če gre npr. za konstanten proces)

$\{T = n\}$ je odvisno od X_{n+1}

Opazka 2.7: Če so $h_0, h_1, \dots$ injektivne in ohranjajo merljivost (tj. A merljiva $\Leftrightarrow h_n(A)$ merljiva), se časi vstavljanja glede na $X_0, X_1, X_2, \dots$ ujemajo s časi vstavljanja glede na $h_0(X_0), h_1(X_1), \dots$ (DV - malo težje)

Definicija: Filtracija (v diskretnem času z naraščanjem v nedogled) na merljivem prostoru $(\Omega, \mathcal{F})$ je zaporedje σ -algeber $\mathcal{F}_0 \subseteq \mathcal{F}_1 \subseteq \mathcal{F}_2 \subseteq \dots \subseteq \mathcal{F}$.

Definicija: Slučajna spremenljivka T z vrednostmi v $\mathbb{N}_0 \cup \{\infty\}$ je čas vstavljanja glede na filtracijo $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$, velja $\{T = n\} \in \mathcal{F}_n$.

Definicija: Za vsak slučajni proces $X_0, X_1, \dots$, kjer ima X_n vrednosti v $(S_n, \mathcal{F}_n)$, definiramo njegovo naravno Filtracijo:

$$\mathcal{F}_n := \sigma(X_0, X_1, \dots, X_n) = \{(x_0, x_1, \dots, x_n) \in D_n; D_n \in \mathcal{Y}_0 \otimes \dots \otimes \mathcal{Y}_n\}.$$

DV: utemelji, da je to res filtracija.

Opazka 2.8: Časi ustavljanja glede na dobičen slučajni proces se ujemajo s časi ustavljanja glede na naravno filtracijo.

Trditev 2.9: Če je T čas ustavljanja in $k \in \mathbb{N}_0$, je $T+k$ prav tako čas vstavljanja.

Dokaz: Za $n=0,1,\dots,k-1$ je $\{T+k=n\} = \{T=n-k\} = \emptyset$.
Za $n=k, k+1, \dots$ pa velja

$$\{T+k=n\} = \{T=n-k\} \in \mathcal{F}_{n-k} \subseteq \mathcal{F}_n \quad \square$$

Trditev 2.10: Naj bo T slučajna spremenljivka z vrednostmi v $\mathbb{N}_0 \cup \{\infty\}$ in $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ filtracija. Naslednje trditve so ekvivalentne:

(1) T je čas vstavljanja glede na $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$.

(2) $\{T \leq n\} \in \mathcal{F}_n$ za vse $n \in \mathbb{N}_0$

(3) $\{T > n\} \in \mathcal{F}_n$ za vse $n \in \mathbb{N}_0$

Dokaz: (2) $\Leftrightarrow$ (3): očitno, saj sta si dogodka $\{T \leq n\}$ in $\{T > n\}$ nasprotna

$$(1) \Rightarrow (2): \{T \leq n\} = \bigcup_{k=0}^{\infty} \underbrace{\{T=k\}}_{\in \mathcal{F}_k \subseteq \mathcal{F}_n} \in \mathcal{F}_n \quad \text{\small } \sigma\text{-alg. zaprte za unije}$$

$$(2) \Rightarrow (1): \{T=n\} = \underbrace{\{T \leq n\}}_{\in \mathcal{F}_n} \setminus \underbrace{\{T \leq n-1\}}_{\in \mathcal{F}_{n-1} \subseteq \mathcal{F}_n} \in \mathcal{F}_n$$

$\mathcal{F}_{-1} := \{\emptyset, \Omega\}$

 $\square$

Trditev 2.11: Če sta T in S časa ustavljanja glede na določeno filtracijo, so to tudi $T+S$, $T \vee S := \max\{T, S\}$ in $T \wedge S := \min\{T, S\}$.

$$\text{Dokaz: } \{T+S=n\} = \bigcup_{k=0}^n \underbrace{\{T=k\}}_{\mathcal{F}_k \subseteq \mathcal{F}_n} \cap \underbrace{\{S=n-k\}}_{\mathcal{F}_{n-k} \subseteq \mathcal{F}_n}$$

$$\{T \vee S \leq n\} = \underbrace{\{T \leq n\}}_{\mathcal{F}_n} \cap \underbrace{\{S \leq n\}}_{\mathcal{F}_n}$$

$$\{T \wedge S \leq n\} = \underbrace{\{T \leq n\}}_{\mathcal{F}_n} \cup \underbrace{\{S \leq n\}}_{\mathcal{F}_n}$$

$\mathcal{F}_i$ so σ -algebre



Opazka 2.8^{1/2} (zadnjič izpustili)

Konstante iz $\mathbb{N}_0 \cup \{\infty\}$ so tudi časi ustavljanja.

Izrek 2.12 [kreпка lastnost Markova]: Naj bo:

- časovna homogena markovska veriga $X_0, X_1, \dots$ na števni množici stanj S s prehodnimi verjetnostmi $p_{x,y}$, $x, y \in S$, in fiksno začetno porazdelitvijo
- $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ naravna filtracija tega procesa;
" $\{(X_0, X_1, \dots, X_n) \in D_n \mid D_n \in S^{n+1}\}$

- T čas ustavljanja glede na to filtracijo (ekvivalentno glede na proces $X_0, X_1, \dots$)

- $B = \bigcup_{n=0}^{\infty} (\{T=n\} \cap B_n)$, kjer je $B_n \in \mathcal{F}_n$, in $P(B) > 0$

Pogojno na B (in v verjetnostnem prostoru, ki je zožitev prvotnega na poljuben dogodek Ω' , za katerega je $B \subseteq \Omega' \subseteq \{T < \infty\}$) je tedaj slučajni proces $X_T, X_{T+1}, \dots$, spet markovska veriga z istimi prehodnimi verjetnostmi in fiksno začetno porazdelitvijo, ki je pogojna porazdelitev slučajne spremenljivke X_T glede na B .

Opazka 2.13: Med pomembnimi legitimnimi dogodki B so dogodki $\{T \in K\}$, kjer je $K \subseteq \mathbb{N}_0$.

Dokaz izreka 2.12: Preveriti je treba:

$$\mathbb{P}^B(X_{T+m+1} = y \mid X_T = x_0, \dots, X_{T+m} = x_m) = p_{x_m, y}.$$

|| tretje 1.2

$$\mathbb{P}(X_{T+m+1} = y \mid B \cap \{X_T = x_0, \dots, X_{T+m} = x_m\})$$

$$\text{brž ko je } \mathbb{P}^B(X_T = x_0, X_{T+1} = x_1, \dots, X_{T+m} = x_m) > 0.$$



$$\mathbb{P}(B \cap \{X_T = x_0, \dots, X_{T+m} = x_m\}) > 0$$

$$\mathbb{P}(\underline{X_{T+m+1} = y} \mid B_n \cap \{T = n, X_T = x_0, \dots, \underline{X_{T+m} = x_m}\})$$

B_n

$T=n$

$$= \mathbb{P}(X_{n+m+1} = y \mid \underbrace{(x_0, x_1, \dots, x_n) \in D_n}_{B_n}, \underbrace{(x_0, x_1, \dots, x_n) \in D_n'}_{T=n}, x_n = x_0, x_{n+1} = x_1, \dots, x_{n+m} = x_m)$$

$$= \underline{p_{x_m, y}} \quad (\text{Opazka 2.3})$$

Dogodek $B \cap \{X_T = x_0, \dots, X_{T+m} = x_m\}$ pa je števna disjunktna unija dogodkov $B_n \cap \{T = n, X_T = x_0, \dots, X_{T+m} = x_m\}$. Po tretjevi 1.3 mora biti tudi

$$\mathbb{P}(X_{T+m+1} = y \mid B \cap \{X_T = x_0, \dots, X_{T+m} = x_m\}) = p_{x_m, y}.$$

